

# BorSTART

FERTEQ



**HNOJIVO ES – SUSPENZNÍ HNOJIVO S BOREM (B JAKO BORITAN SODNÝ)**

**HNOJIVO ES – SUSPENZNÉ HNOJIVO S BÓROM (B AKO BORITAN SODNÝ)**

**E.1.1.1F**

Tento výrobek je možné použiť v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Tento výrobek je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.

Živina	Živina	Hmotnostní % Hmotnostné %	Obsah živin Obsah živín
Vodorozpustný bor (B)	Vo vode rozpustný bór (B)	9,5 %	120 g/l



13kg **10L**

# CZ NEBEZPEČÍ

**H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H360DF** Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v lůně matky. **P201** Před použitím si obzvláště pečlivě přečtěte speciální instrukce. **P202** Nepoužívejte, pokud jste si nepřečli všechny bezpečnostní pokyny a neporozumíte jim. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranné oděvy/ochranné brýle/ochranný štít. **P308+P313+P338** Při závažném podráždění: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P308+P313** Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetení. **P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetení.

**Identifikátor složky:** kyselina boritá (CAS č. 10043-35-3), tetraboritan disodný pentahydrát (CAS č. 12179-04-3).

## DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Termín aplikace
Řepka	2 l/ha	od fáze prodlužovacího růstu (C1–C2) až po fázi počátku kvetení (D1)
Slunečnice	2,5 l/ha	od fáze 5–6. listu až po fázi hvězdy
Hrách, fazole	1,5 l/ha	při výšce rostliny 10–12 cm až do fáze kvetení
Cukrová řepa	2x 1,5 l/ha	ve fázi od 6.–8. listu do plného zapojení řádků

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

**ZPŮSOB APLIKACE: Příprava směsi:** 1. Kanystr před použitím protřepejte. 2. Nalijte do postřikovače ¾ požadované dávky. 3. Za stálého míchání přidejte BoStart® do připravované směsi jako poslední složku. 4. Doplňte zbytkem vody. 5. Za stálého míchání udržte homogenní směs. Aplikujte v období aktivního růstu, vyhněte se aplikaci za silného slunečního záření a při vysokých teplotách. Dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi.

**MÍSTLNOST:** BoStart® je místelný s většinou přípravků na ochranu rostlin. V každém případě však doporučujeme před prvním použitím provést test místelnosti.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:** Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekurte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivem. Chráněte před mrazem. Neslučitelné s: silné zářadí.

**LIVKADÍNA:** Nekládajte se odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Přemístěte do vhodného kontejneru a zapište sběr odpadu specializovanou firmou pro zneškodňování odpadu.

**ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST:** Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Nepoukytje se žádná záruka jakéhokoli druhu související s použitím této hnojiva. Možná rizika spojená se špatným skladováním, manipulací a použitím jsou na odpovědnosti uživatele.

**POKYNY PŘE PRVNÍ POMOČ:** Nečistě-li se ve expozici dobře nebo přetrvávají-li potize, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí uvolněte ústa postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolejte lékaře. Při bezvědomí nepodávejte nic ústí. **Při nadýchání:** Vyneďte postiženého na čerstvý vzduch, udržte jej v kladu a teple. Přetrvávají-li potize, vyhledejte lékaře. **Při styku s kůží:** V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mydla. Jako preventivní ochranu použijte ochranný krém na ruce. Přetrvávají-li potize, vyhledejte lékaře. **Při zasazení oči:** Oběma očima okamžitě vyplachujte vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut, vyplachujte silným proudem vody – třicíti poranění rohovky. Vyhledejte odborného lékaře. **Při požití:** Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypít je 1–2 dcl vody. **IHNEĎ vyhledejte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření:** Informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i eventuelní následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 12808, Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

## PRO PROFESIONÁLNÍHO UŽIVATELE

**Datum výroby:** uvedeno na obalu  
**Číslo výrobní šarže:** uvedeno na obalu  
**Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003):** SOUFFLET AGRÓ s.á.s.,  
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, ČR,  
Tel.: +420 562 328 320  
**Původ zboží:** SDP, 1 rue Quésnay, 02000 LAON, France

# SK NEBEZPEČENSTVO

**H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **H360DF** Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa. **P201** Pred použitím sa obzerte na osobitními pokynmi. **P202** Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. **P280** Noste ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné okuliare, ochranu tváre. **P308+P313+P338** PO ZASIAHnutí OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P308+P313** PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/šarostrovstiev. **P337+P313** Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/šarostrovstiev.

**Identifikátor složky:** kyselina boritá (CAS č. 10043-35-3), tetraboritan disodný (CAS č. 12179-04-3).

## ODPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Termín aplikace
Řepka	2 l/ha	od začiatku vegetácie (C1–C2) až po začiatok kvitnutia (D1)
Slnečnica	2,5 l/ha	od 5 do 6 listov do fázy až do fázy objavenia sa súkvetia
Hrách, poľná fazuľa	1,5 l/ha	keď rastliny dosiahnu výšku 10-12 cm až do objavenia sa kvetných pukov
Cukrová repa	2x 1,5 l/ha	od 4-6 listov, do uzatvorenia radov

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Nepřekročit príslušné dávkovanie.

**POKYNY PRE APLIKÁČU: Příprava tank-mixu:** 1. Před použitím důkladně promešajte. 2. Zásobník postřikovače naplňte vodou do ¾ požadovaného objemu postřiku. 3. Za stálého miešania pridajte BoStart® do pripravovanej zmesi ako posledný. 4. Doplňte čistou vodou. 5. Pokračujte v miešaní, až pokiaľ je postřiková zmes homogénna. Aplikujte vo fáze aktívneho rastu rastlín. Vyhnite sa aplikáciám počas najhoršich fáz dňa. Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte primerané bezpečnostné opatrenia.

**MÍSTLNOST:** BoStart® je kompatibilný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín. Pred aplikáciou každej novej zmesi je potrebné uskutočniť všetky potrebné fyzikálno-chemické a biologické pokusy.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:** Uchovávať mimo dosahu mrazu (počas skladovania sa vyvarujte mrazu). Uchovávať mimo potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá. Nádobu uchovávať tesne uzatvorenú na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávať iba v pôvodnej nádobe. Nekompatibilné produkty: Silné zářadí.

**LIVKADÍNA:** Nakladajte s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Odpad premiestnite do vhodného kontajnera a zaistite zber odpadu specializovanou firmou pre zneškodňovanie odpadu.

**ZÁRUKA A ZODPOVEDNOST:** Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručujú obsah špecifických účinných zložiek v akceptovateľnej tolerancii pri balení. Neopkytje sa žiadna záruka akéhokoli druhu súvisiacia s použitím tohto hnojiva. Možné riziká spojené so zlyhaním skladovania, manipuláciou a použitím sú na zodpovednosti používateľa.

**POKYNY PRE PRVNÍ POMOČ: Všeobecné opatrenia prvej pomoci:** Ak sa nečistě dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte štítk ak je to možné). **Opatrenia prvej pomoci po vdychnutí:** Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. **Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou:** Produkt nečistě pokožku. **Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami:** PO ZASIAHnutí OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **AK podráždenie očí pretrváva:** Vyhľadajte lekársku pomoc/šarostrovstiev. **Opatrenia prvej pomoci po požití:** Okamžite vylúpte TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Centrum lekárskeho ošarostrovstiev. Informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Okamžite vyzvite Národné toxikologické informačné centrum (Univerzita nemocnica v Bratislave), Limbová 5, 833 05 Bratislava, 254 776 166 alebo telefónom.

## PRE PROFESIONÁLNÉHO UŽIVATELE

**Datum výroby:** uvedené na obale  
**Číslo výrobné šarže:** uvedené na obale  
**Výrobca (v zmysle nariadenia ES č. 2003/2003):** SOUFFLET AGRÓ s.á.s.,  
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, ČR. Tel.: +420 562 328 320  
**Původ tovaru:** SDP, 1 rue Quésnay, 02000 LAON, France

EM8 02602.A



UFI: RT20-V09R-U00S-Y3D3

