



CereaSTART

LISTOVÉ HNOJIVO SILNÝ ŠARTOVACÍ ÚČINOK V RANEJ FÁZE RASTU

Listové hnojivo, ktoré stimuluje rast obilnín a vývoj koreňového systému v ich raných fázach rastu. Prispieva k rozvoju produkčných orgánov a listovej plochy rastlín a zabezpečuje lepšiu absorpciu živín do koreňového systému bez ohľadu na podmienky pôdy.

VÝHODY VYSOKEJ KONCENTRÁCIE FOSFORU

- ▶ posilňuje koreňový systém rastlín, takže je schopný absorbovať maximálne množstvo živín z pôdy sám
- ▶ kompenzuje deficit prijateľného fosforu v pôde
- ▶ podporuje vývoj produkčných orgánov
- ▶ udržiava živiny v liste rozpustné

VÝHODY LISTOVEJ APLIKÁCIE

Absorpcia rastliny fosforu listami podporuje lepšiu prienik živín do koreňa bez ohľadu na podmienky pôdy.

Nezávislosť od pH pôdy

rastlina dobre využíva fosfor (t. j. vysoká absorpcia živín) bez ohľadu na pH pôdy.


Nezávislosť od teploty pôdy

rastlina absorbuje viac využiteľného fosforu bez ohľadu na ideálnu teplotu pôdy 21°C. (Ak teplota klesne z 21 na 13 °C, znižuje sa dostupnosť fosforu o 70%, čím sa významne znižuje vývoj koreňových vláskov.)

Nezávislosť od vlhkosti pôdy

rastlina absorbuje fosfor, aj keď je pôda suchá.

Optimálny a rýchly prienik zložiek



ZLOŽENIE: 440 g/l P₂O₅, 76 g/l K₂O, 100 g/l MgO


ODPORUČANÉ DÁVKY A TERMÍNY APLIKÁCIE

Plodina	Dávka	Apl..	Termín aplikácie
jarný jačmeň	3 l	1-3 x	stred odnožovania – 1. kolienko v prípade potreby sa môže opakovať o 10-15 dní
oziminy a jarný jačmeň	3 l	1-3 x	stred odnožovania – 1. kolienko – skorá jar, krátko po obnove vegetácie v prípade potreby sa môže opakovať o 10-15 dní
kukurica	3 l	1-3 x	medzi 4-6 listom, v prípade potreby sa môže opakovať o 10-15 dní
repka	3 l	2 x	1. jeseň – 4-6 list 2. jar – začiatok predĺžovacieho rastu
cukrová repa	3-5 l	1-3 x	4-6 list, v prípade potreby sa môže opakovať o 10-15 dní
zemiaky	5 l	2-3 x	komerčná plodina – na začiatku tvorby hlúz
	10 l	1-2 x	zemiaky na sadivo – začiatok rozvoja hľuzy
hrach	3-5 l	1 x	výška rastliny 10-15 cm




CereaSTART sa môže použiť so štandardnými fungicidmi, insekticidmi a rôznymi herbicidmi.


JAČMEŇ



PŠENICA



CUKROVÁ REPA



ZEMIAKY

