

# StimTOP

FERTEQ



ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO  
ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO

Číslo vzájemného uznání: V621

Číslo vzájomného uznania: 1560

Registrované v Belgii pod čísлом: EM626.DA

Registrované v Belgicku pod čísлом: EM626.DA

**LISTOVÉ HNOJIVO S BIOSTIMULAČNÍM ÚČINKEM**  
**LISTOVÉ HNOJIVO S BIOSTIMULAČNÝM ÚČINKOM**

Obsahuje volné L-aminokyseliny v čisté formě (syntetické) a extrakty z mořských řas.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 20, chrom 50.

Obsah rizikových prvků a látek nepřekračuje limity platné v SR.



# 10L

## NEBEZPEČÍ

**POPS HNOJIVA:** StimTOP je NPK suspenzní hnojivo s biosimulačním účinkem obsahující stopové prvky, aminokyseliny a extrakty z mořských řas. Svým složením významně podporuje vitalitu rostlin a zlepšuje kvalitu produkce. Obsádnuté aminokyseliny a výtahy z mořských řas stimulují růst, efektivně tlumí stresové podmínky a napomáhají rostlině hospodářit s vodou. Hnojivo je určeno pro aplikaci na list.

Druh živiny	Hmotnostní %	Druh živiny	Hmotnostní %
Dusík (N) – celkový	7,7 %	Železo (Fe)	0,025 %
Z toho močovinový dusík	7 %	Mangan (Mn)	0,042 %
Z toho ostatní dusík	0,7 %	Molybden (Mo)	0,004 %
Fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4,7 %	Zinek (Zn)	0,023 %
Draslík (K <sub>2</sub> O)	4,6 %	Aminokyseliny	1 %
Bor (B)	0,042 %	Extrakt z mořských řas	10,2 %
Meď (Cu)	0,012 %		

**ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ:** Pro dosažení rovnoměrného pokrytí porostu použijte dostatečné množství vody. Vyhnete se aplikaci při silném slunečním záření a při vysokých teplotách. Pokud lze, provádějte postřik večer nebo brzy ráno. Velmi mladé listy a střešovaný porost může být náchylnější k popálení. V těchto případech aplikujte menší množství přípravku a upovídajícím způsobem upravte interval aplikace. Pouze pro vnější použití. Viz doporučené dávkování na této etiketě.

## ORIENTAČNÍ DÁVKOVÁNÍ:

Druh plodiny	Dávkování	Minimální objem vody	Termín aplikace
Obiloviny	2–3 l/ha	100 l/ha	od fáze 1. kolénka do fáze praporcového listu
Luskoviny	2–3 l/ha	100 l/ha	začátek kvetení
Brambory	2–3 l/ha	100 l/ha	3–4 aplikace, od fáze začátku tvorby hlíz, pak každých 14 dní
Kukuřice	5 l/ha	100 l/ha	1–2 aplikace, od fáze 4–6 listů
Řepka, cukrová řepa	2–3 l/ha	100 l/ha	1–2 aplikace, v případě stresu, pak podle potřeby na dobře rozvinutou listovou plochu
Zelenina	2–3 l/ha	100 l/ha	1–2 aplikace během vegetace

**PŘÍPRAVA POSTRIKOVÉ KAPALINY:** Naplňte postřikovač polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchání. Prořepete kanyst s přípravkem StimTOP a za stálého míchání doplňte doporučené množství. Přidejte zbývající množství vody. V případě použití tank mixu přidávejte StimTOP jako poslední. Nepřestávejte míchat. Po skončení práce postřikovač důkladně očistěte a omyjte (např. přípravkem KeepGUARD).

**MÍSTELNOST:** V případě pochybnosti je třeba provést test místelstnosti v malém měřítku.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:** Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přítomen skladovaný a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivy. Chraňte před mrazem. Malé riziko spojené se špatným skladováním, manipulací a použitím jsou na odpovědnosti uživatele.

**POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PŘÁČI:** Identifikátor výrobku: tetranátrium-ethylendiaminotetraacetát (EX: 200-573-9) **H318** Spůsobuje vážné poškození očí. **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P273** Zabráňte uvolnění do životního prostředí. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít. **P305+P351+P338** Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyměnit snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře... **P501** Odstraňte obsah/obal podle stávajících předpisů.

**Minimální doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování  
**Způsob likvidace obalů:** Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.  
**Datum výroby:** uvedeno na obale  
**Číslo výrobní šarže:** uvedeno na obale  
**Dovozce:** SOUFFLET AGRÓ a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov  
**Výrobce:** AGRONUTRITION, Parc Actiwestre – 3, avenue l'Orchidée, 31390 CARBONNIE – Francie

## NEBEZPEČENSTVO

**POPS HNOJIVA:** StimTOP je NPK suspenzní hnojivo s biosimulačním účinkem obsahující stopové prvky, aminokyseliny a extrakty z mořských řas. Svým složením významně podporuje vitalitu rostlin a zlepšuje kvalitu produkce. Obsádnuté aminokyseliny a výtahy z mořských řas stimulují růst, efektivně tlumí vplyv stresových podmínek a napomáhajú rastline hospodáriť s vodou. Hnojivo je určené pre aplikáciu na list.

Druh živiny	Hmotnostní %	Druh živiny	Hmotnostní %
Dusík (N)	7,7 %	Železo (Fe)	0,025 %
Z toho močovinový dusík	7 %	Mangan (Mn)	0,042 %
Z toho ostatní dusík	0,7 %	Molybden (Mo)	0,004 %
Fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	4,7 %	Zinek (Zn)	0,023 %
Draslík (K <sub>2</sub> O)	4,6 %	Aminokyseliny	1 %
Bor (B)	0,042 %	Extrakt z mořských řas	10,2 %
Meď (Cu)	0,012 %		

**ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ:** Pre dosiahnutie rovnomerného pokrytia porastu použite dostatočné množstvo vody. Vyhnite sa aplikácii pri silnom slnečnom žiarení a pri vysokých teplotách. Pokiaľ možno vykonávajte postrek večer alebo skoro ráno. Veľmi mladé listy a střešovaný porast môže byť náchylnější k popáleniu. V týchto prípadoch aplikujte menšie množstvo prípravku a zodpovedajúcim spôsobom upravte interval aplikácie. Len na vonkajšie použitie. Pozri odporúčané dávkovanie na tejto etikete.

## ORIENTAČNÉ DÁVKOVANIE:

Druh plodiny	Dávkovanie	Minimálny objem vody	Termín aplikácie
Obiloviny	2–3 l/ha	100 l/ha	od fázy 1. kolienka do fázy vlnkového listu
Strukoviny	2–3 l/ha	100 l/ha	začiatok kvitnutia
Zemiaci	2–3 l/ha	100 l/ha	3–4 aplikácie, od fázy začiatku tvorby hlíz, potom každých 14 dní
Kukurica	5 l/ha	100 l/ha	1–2 aplikácie, od fázy 4–6 listov
Reпка, cukrová reпа	2–3 l/ha	100 l/ha	1–2 aplikácie, v prípade stresu, potom podľa potreby na dobre rozvinutú listovú plochu
Zelenina	2–3 l/ha	100 l/ha	1–2 aplikácie behom vegetácie

**PŘÍPRAVA POSTREKU:** Naplňte postřekovač polovicou požadovaného množství vody a zapněte míšanie. Preprete kanister s prípravkom StimTOP a za stálého miešania doplnite odporúčané množstvo. Prídajte zvyšné množstvo vody. V prípade použitia tank mixu pridávajte StimTOP ako posledný. Neprestávajte miešať. Po skončení práce postřekovač dôkladne očistite a umyte (napr. prípravkom KeepGUARD).

**MIEŠATELNOST:** V prípade pochybností je potrebné vykonať test miešateľnosti v malom meradle.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNIA:** Skladovať v originálnych, tesne uzavretých nádobách na dobre vetranom a chladnom mieste. Nejezte, nepijte a nekuřte v miestach, kde je prípravok skladovaný a používaný. Neskladujte spolu s potravinami a krmivami. Chránite pred mrazom. Možné riziko spojené so zlyhaním skladováním, manipuláciou a použitím sú na zodpovednosti používateľa.

**POKYNY PRE BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVIA PŘI PŘÁČI:** Identifikátor produktu: tetranátrium-ethylendiaminotetraacetát (EX: 200-573-9) **H318** Spůsobuje vážne poškození očí. **H412** Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P102** Uchovávať mimo dosahu detí. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P280** Noste ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné okuliare/ochrannú tvár. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. **P310** Okamžite volve TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lékařa... **P501** Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regiónalnými/národnými/mezinárodnými predpismi.

**Minimálna doba použiteľnosti:** 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania  
**Způsob likvidácie obalov:** Odstráňte obsah / nádobu ako nebezpečný odpad.

**Datum výroby:** uvedené na obale  
**Číslo výrobné šarže:** uvedené na obale  
**Dovozca:** SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a., Rybníčnik 40, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06  
**Výrobca:** AGRONUTRITION, Parc Actiwestre – 3, avenue l'Orchidée, 31390 CARBONNIE – Francie

