

# BorphoSTART

FERTEQ



**KFV 1(C)(I)(b)(i):** JEDNOSLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI  
**PFC 1(C)(I)(b)(i):** JEDNOZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHO  
MAKROŽIVINY

**Roztokové hnojivo s obsahem fosforu a boru**  
**Roztok hnojiva s obsahem fosforu a bóru**

Živina	Živina	Hmotnostní % Hmotnostné %	Obsah živin Obsah živín
Fosfor ( $P_2O_5$ ) vodorozpustný	Fosfor ( $P_2O_5$ ) vodorozpustný	7 %	100 g/l
Bor (B) vodorozpustný	Bór (B) vodorozpustný	8,4 %	120 g/l

**Složky:** reakční produkty monoethanolaminu a kyseliny borité (1:3) EC 701-024-0 (KSM1\*), polyfosforečné kyseliny, sodné soli CAS 68915-31-1 (KSM8\*), voda CAS 7732-18-5 (KSM1\*)

\*KSM1 Látky a směsi z původního materiálu; \*KSM8 Polymery s živinami

**Zložky:** produkty reakce monoethanolaminu a kyseliny borité (1:3) EC 701-024-0 (CMC1\*), polyfosforečné kyseliny, sodné soli CAS 68915-31-1 (CMC8\*), voda CAS 7732-18-5 (CMC1\*)

\*CMC1: Původné látky a směsi; \*CMC8: Živinové polyméry



CE 14,1 kg

**10L**

**DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ**

Plodina	Dávka	Termín aplikácie
Cukrová repa	2x 1–2 l/ha	1. aplikácie: po dostatočnom vývoji listovej plochy (BBCH 39) 2. aplikácie: T1 + 3 týždne (BBCH 39) na podzim: počas ružice (BBCH 15)
Ďapka	2x 1–2 l/ha	na jaře: od fáze predĺžovacieho rastu (BBCH 30) na fáze kvetných pupov (BBCH 55)
Slanečnica	2 l/ha	6/8 páru listů (BBCH 15/18)
Hrách, fazuľa, vikev, čočka	1,5 l/ha	od 10–12 cm, BBCH 15 do objavení pupenů (BBCH 51)
Vojčiška	1 l/ha	pri opätovnom rústu plodiny a po každej seči
Mak	1 l/ha	od 6. listu do začiatku predĺžovacieho listu (BBCH 16 až BBCH 30)

Používať pouze v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať doporučené dávkovanie.

**ZPŮSOB APLIKACE: Příprava směsí:** 1. Kanystr před použitím protřepejte. 2. Nalijte do postřikovače ¾ vody nezbytné k aplikaci. 3. Za stálého míchání přidejte BorphoSTART. 4. Doplňte zbytkem vody. 5. Za stálého míchání udržujte homogenní směs. Aplikujte v období aktivního růstu, vyhněte se aplikaci za stěhování sklenného zařízení a při vysokých teplotách. Dodržujte bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi.

**MÍSTELNOST:** Přípravok BorphoSTART je mísitelný s většinou přípravků. V každém případě však doporučujeme před prvním použitím provést test místelnosti.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:** Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobre větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivry. Chráněte před mrazem.

**LIKVIDACE:** Nakládejte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Přemístěte do vhodného kontejneru a zajištěte sber odpadu specializovanou firmou pre zneškodňování odpadu.

**POKYNY PRO PRVNÍ POMOČ:** Necitěte-li se po expozícii dobre nebo pŕetřvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékářské ošetení. Při bezvědomí uložit postíženého do stabilizační polohy na boku a privolat lékaře. Při bezvědomí nepodávat nic ústy. **Při nadýchání:** Vyvedte postíženého na čerstvý vzduch, udržte jej v klidu a teple. Pŕetřvávají-li potíže, vyhledajte lékaře. **Při styku s kůží:** V případě kontaktu s kůží okamžitě umyte velkým množstvím vody a mydla. Jako preventivní ochranu použijte ochranný krém na ruce. Pŕetřvávají-li potíže, vyhledajte lékaře. **Při zasažení očí:** Otevřené oči okamžitě vypláchnout vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut, nevyplachujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Pŕetřvávají-li potíže, vyhledajte lékaře. **Při požití:** Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypít 1–2 dl vody. Při potížích vyhledajte lékaře. **Při vyhledání lékářského ošetření:** Informujte lékaře o přípravku, se kterým postížený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (eventuálně následnou terapii) konzultovat s **Toxikologickým informáčním střediskem: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 12808, Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

**PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE**

**Datum výroby:** uvedeno na obalu  
**Číslo výrobní šarže:** uvedeno na obalu  
**Výrobce:** SOUFFLET AGRO a.s.,  
Průmyslová 2170/12, 796 01  
Prostějov, ČR, Tel. +420 582 328 320  
**Původ zboží:** SDP, 1 rue Quesnay,  
02000 LAON, France



**DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNIE**

Plodina	Dávka	Termín aplikácie
Cukrová repa	2x 1–2 l/ha	1. aplikácia: keď sú vynútné všetky listy (BBCH 39) 2. aplikácia: T1 + 3 týždne (BBCH 39 + 3 týždne) na jeseň: štádiom ružice (BBCH 15) na jar: od štádia predĺžovacieho rastu (C1–C2) BBCH 30 – do štádia kvetných pupov (D1), (BBCH 55)
Repka ozimná	2x 1–2 l/ha	
Slanečnica	2 l/ha	štádiom 6–8 párov listů (BBCH 15–18)
Hrách, fazuľa, vika, šošovica	1,5 l/ha	od štádia 10–12 cm, BBCH 15 do objavenia sa kvetných pupkov (BBCH 51)
Lučerna	1 l/ha	pri opätovnom rúste plodiny a po každej kosbe
Mak	1 l/ha	od 6. listu do začiatku predĺžovacieho rastu (BBCH 16 až BBCH 30)

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

**POKYNY PRE APLIKÁCIU: Příprava tank-mixu:** 1. Pred použitím dôkladne premiešajte. 2. Zásobník postrekača naplňte vodou do ¾ požadovaného objemu postreku. 3. Do vody v zásobníku vlejte najskôr BorphoSTART a následne pri neustálom miešaní prívrajte ostatné prípravky. 4. Doplňte čistou vodou. 5. Pokračujte v miešaní, až pokiaľ je postrekač zmes homogénna. Aplikujte vo fáze aktívneho rastu rastlín. Vyhnajte sa aplikáciám počas najhoršejších fáz fázy. Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte primerané bezpečnostné opatrenia.

**MÍSTELNOST:** BorphoSTART je kompatibilný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín. Pred aplikáciou každej novej zmesi je potrebné uskutočniť všetky potrebné fyzikálo-chemické a biologické pokusy.

**PODMENY SKLADOVÁNIA:** Uchovávať mimo dosahu mrazu (počas skladovania sa vyvarujte mrazu). Uchovajte mimo potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá. Nádobu uchovávajte tesne uzavorenú na chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte v pôvodnom obale.

**LIKVIDÁCIA:** Nakladajte s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Odpad premiestnite do vhodného kontajnera a zaisťte zber odpadu špecializovanou firmou pre zneškodňovanie odpadu.

**POKYNY PRE PRVŮ POMOČ: Všeobecné opatrenia prvej pomoci:** Ak sa necitíte dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte štítek ak je to možné). **Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí:** Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postíženého na čerstvý vzduch a nechajte ho odychovať v polohe, ktorú má umožniť pohodlné dýchanie. **Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou:** V prípade kontaktu s kožou umyte veľkým množstvom mydla a vody. **Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami:** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opätne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie pretrváva, obráťte sa na očného lekára. **Opatrenia prvej pomoci po požití:** Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **Pri vyhľadání lekářského ošetření:** Informujte lekára o prípravku, s ktorým postížený pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s **Národným toxikologickým informáčním centrom: Okružní volejte Národní toxikologické informační centrum (Univerzitní nemocnice v Bratislave), Limbová 5, 833 05 Bratislava, 254 774 166 alebo lekára.**

**PRE PROFESIONÁLNÉHO POUŽIVATEĽA**

**Datum výroby:** uvedené na obale  
**Číslo výrobné šarže:** uvedené na obale  
**Výrobca:** SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. Rybničná 40, Bratislava - mestská časť Vajpory 831 06  
**Pôvod tovaru:** SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France



BorphoSTART