

# NitroTOP<sup>NG</sup>

FERTEQ



**KFV 1(C)(I)(b)(i):** JEDNOSLOŽKOVÉ KAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S MAKROŽIVINAMI

**PFC 1(C)(I)(b)(i):** JEDNOZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY

**Roztokové hnojivo s obsahem dusíku, hořčíku a síry**

**Roztok hnojiva s obsahem dusíka, horčíka a síry**

Živina	Živina	Hmotnostní % Hmotnostné %	Obsah živin Obsah živin
Dusík (N) celkový	Dusík (N) celkový	23,1 %	300 g/l
z toho močovinový	z toho močovinový	15,4 %	
z toho močovino-formaldehydový	z toho močovinoformaldehydový	7,7 %	
Hořčík (MgO) vodorozpuštěný	Horčík (MgO) vodorozpuštěný	2,5 %	33 g/l
Síra (SO <sub>3</sub> ) vodorozpuštěná	Síra (SO <sub>3</sub> ) vodorozpuštěná	5,2 %	67 g/l

**Složky:** močovina CAS:57-13-6 (KSM1\*), močovinový formaldehyd CAS:9011-05-6 (KSM8\*), síran hořečnatý CAS: 10034-99-8 (KSM1\*)

\*KSM1: Látky a směsi z původního materiálu; \*KSM8: Polymery s živinami

**Zložky:** močovina CAS:57-13-6 (CMC1\*), močovinový formaldehyd CAS:9011-05-6 (CMC8\*), síran horečnatý CAS: 10034-99-8 (CMC1\*)

\*CMC1: Původné látky a směsi; \*CMC8: Živinové polyméry



soufflet  
AGRO



CZ

SK

CE 12,8 kg

10 L

## CZ

### DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikace	Termín aplikace
Pšenice	15–20 l	1 x	od objevení se praporcového listu až do konce metání
Cukrovka	10–20 l	1–2 x	1. fáze 4–6 listů 2. 30 dní po první aplikaci
Řepka olejka	10–15 l 15–20 l	1–2 x	1. podzim – fáze 4–8 listů 2. jaro – začátek prodloužovacího růstu až butonizace
Slunečnice	10–15 l	1 x	fáze 5–6 párů listů až fáze hvězdy
Kukuřice	15–20 l	1–2 x	1. fáze 4–6 listů 2. 10–15 dní po první aplikaci
Brambory	15–20 l	1 x	začátek tvorby hlíz až počátek květu

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

**ZPŮSOB APLIKACE: Příprava směsi:** Pro lepší účinnost použijte optimální dávku vody na ha, aby ošetření listů bylo rovnoměrné a zároveň nedocházelo ke stékání postřiku. Doporučená dávka vody je minimálně 100 l/ha. Odměřené množství hnojiva nalijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na požadovaný objem. Připravený postřik aplikujte během několika hodin. Doporučujeme ošetřovat při teplotě 6 až 25 °C.

**MISĚTELNOST:** NitroTOP<sup>®</sup> je mistelný s běžně používanými fungicidy a insekticidy, do směsi jej přimíchávejte až jako poslední. V každém případě však doporučujeme před prvním použitím provést test mistelnosti. V případě kombinací s jinými listovými hnojivy, doporučujeme konzultaci s jejich výrobcem.

**POMÍNKY SKLADOVÁNÍ:** Skladovat v originálních, těsně uzavřených nádobách na dobře větraném a chladném místě. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde je přípravek skladován a používán. Neskladovat společně s potravinami a krmivy.

**P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P202** Nepoužívejte, pokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozumíte jim. **P264** Po manipulaci důkladně omyjte ruce. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P501** Odstraňte obsah/nádobu podle státních předpisů.

**LIVKIDACE:** Nakládajte s odpadem v souladu se zákonem o odpadech. Přemístěte do vhodného kontejneru a zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro zneškodňování odpadů.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přetřásána nápravná opatření.

**POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:** Necitíte-li se po expozici dobře nebo přetrvávají-li potíže, je nutné vyhledat lékařské ošetření. Při bezvědomí uložte postiženého do stabilizační polohy na boku a přivolejte lékaře. Při bezvědomí nepodávejte nic ústy. **Při nadychnání:** Vывeďte postiženého na čerstvý vzduch, udržujte jej v klidu a teple. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. **Při styku s kůží:** V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Jako preventivní ochranu použijte ochranný krém na ruce. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. **Při zasažení očí:** Otevřete oči okamžitě vypláchnout vodou po dobu nejméně 10 až 15 minut, nepřevlhčujte silným proudem vody – hrozí poranění rohovky. Přetrvávají-li potíže, vyhledejte lékaře. **Při požití:** Pokud je osoba při vědomí, nevyvolávejte zvracení. Vypláchnout ústa vodou a vypítje 1–2 dcl vody. Při potížích vyhledejte lékaře. **Při vyhledání lékařského ošetření:** Informujte lékaře o přípravku, se kterým postýženi pracovali a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i eventuelní následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: **Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

### PRE PROFESIONÁLNEHO POUŽÍVATEĽA

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Číslo výrobní šarže:** uvedeno na obalu

**Výrobce:** SOUFFLET AGR0 s.a.s., Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, ČR, Tel. +420 582 328 320

**Původ zboží:** AGRONUTRITION, Parc Activereste-3 av de l'Orchidée,

31390 CARBONNE, France



## SK

### DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina	Dávka	Aplikácia	Termín aplikácie
Pšenica	15–20 l	1 x	od objavenia sa vlajkového listu až do konca klasenia
Cukrová repa	10–20 l	1–2 x	1. fáza 4–6 listov 2. 30 dní po prvej aplikácii
Řepka olejka	10–15 l 15–20 l	1–2 x	1. jeseň – fáza 4–8 listov 2. jar – začiatok predživacieho rastu až butonizácie
Slnečnica	10–15 l	1 x	fáza 5–6 párov listov až fázy hviezdy
Kukurica	15–20 l	1–2 x	1. fáza 4–6 listov 2. 10–15 dní po prvej aplikácii
Zemiaky	15–20 l	1 x	začiatok tvorby hlíz až začiatok kvitnutia

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušnú dávku vody na ha.

**POKYNY PRE APLIKÁCIU: Příprava tank-mixu:** Pro lepší účinnost používejte optimální dávku vody na ha, aby ošetření listů bylo rovnoměrné a zároveň nedocházelo ke stékání postřiku. Odporúčaná dávka vody je minimálne 100 l/ha. Odmerané množstvo hnojiva nalejte do nádrže postřikovača naplnjenej do polovice vodou a za stálého miešania doplňte na požadovaný objem. Pripravený postrek aplikujte v priebehu niekoľkých hodín. Odporúčame ošetrovať pri teplote 6 až 25 °C.

**MIEŠATEĽNOSŤ:** NitroTOP<sup>®</sup> je miešateľný s bežne používanými fungicidmi a insekticidmi, do zmesi ho primiešavajte až ako posledný. V každom prípade však odporúčame pred prvým použitím urobiť test miešateľnosti. V prípade kombinácií s inými listovými hnojivami odporúčame konzultáciu s ich výrobcami.

**POMIEKNY SKLADOVANIA:** Uchovávaťe vždy v obaloch z rovnakého materiálu ako je originálne balenie. Uchovávaťe mimo dosahu detí. Uchovávaťe mimo dosahu potravín a nápojov vrátane potravín a nápojov pre zvieratá. Chránite pred akýmkoľvek zdrojom tepla. Skladovacia teplota: 0–35 °C Skladujte na suchom mieste.

**P102** Uchovávejte mimo dosahu dětí. **P202** Nepoužívejte, když si nepřečetíte všechny bezpečnostní pokyny a neporozumíte jim. **P264** Po manipulaci si starostlivo umyte ruce. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P501** Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.

**LIVKIDÁCIA:** Nakládajte s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Odpad premiestnite do vhodného kontajnera a zaistite zber odpadu specializovanou firmou pre zneškodňovanie odpadov.

Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.

**POKYNY PRE PRVÚ POMOC:** Ak sa prejavia zdravotné potiaže alebo v prípade pochybnosti upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tohto bezpečnostného listu. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizačnej polohy na boku a dávajte pozor na priechodnosť dýchacích ciest. V prípade zvracania postihnutého dávajte pozor, aby nedošlo k vdychnutiu zvratkov. Keď zavoláte na tiesňovú čísku, toxikologické stredisko alebo lekára, prineste obal, štítko alebo kartu bezpečnostných údajov. **V prípade nadychnania:** Vezmite postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade respiračnej poruchy vyhľadajte lekárskolekársku službu. **V prípade poľitia alebo zasiahnutia očí:** Dôkladne umývajte čerstvou vodou po dobu 20 minút. Ak sa objaví sčervenanie, podráždenie alebo žiakové nepohodlie, obráťte sa na očného lekára. **V prípade zasiahnutia odov alebo zasiahnutia pokožky:** Dôkladne umyte vodou. Ak je prítomné začervenanie alebo podráždenie, vyhledejte lekára. **V prípade požitia:** Vyhľadajte lekársku pomoc, ošetrujúcoumu ukážte etiketu výrobku. Pri náhodnom požití informujte lekára, ktorý určí, či je potrebné ďalšie pozorovanie alebo nemocničná starostlivosť. Uchúťte mu etiketu výrobku. **Pri vyhľadani lekárskeho ošetrovani:** informujte lekára o prípravku, s ktorým postýženi pracovali a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom. **Národné toxikologické informačné centrum (Univerzitná nemocnica v Bratislave), Límbová 5, 833 05 Bratislava, 254 774 166.**

### PRE PROFESIONÁLNEHO POUŽÍVATEĽA

**Datum výroby:** uvedeno na obale

**Číslo výrobní šarže:** uvedené na obale

**Výrobca:** SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a., Rybníční 40, Bratislava – mestská časť Vajnory 831 06

**Původ tovaru:** AGRONUTRITION, Parc Activereste-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France

