



Jačmeň ozimný sladovnícky **2R**

COMTESSE

JAČMEŇ Z UŠŤACHTILEJ SLADOVNÍCKEJ LÍNIE

typ
DVOJRADOVÝ

skorosť
SKORÁ

rastliny
**STREDNE VYSOKÉ
AŽ NÍZKE (88 cm)**

HTZ
VYSOKÁ (48 g)

zrno
**VEĽMI VYSOKÝ
PODIEL ZRNA (92 %)**


odolnosť k poliehaniu
DOBRÁ

- Super výnosná odroda v podobe dvojradového ozimného sladovníckeho jačmeňa s predpokladom uplatnenia vo všetkých výrobných oblastiach
- Veľmi vysoký podiel predného zrna, nízky obsah N-látok, vysoký extrakt
- Odolná k vymrznutiu a prísuškom
- Z výsledkov pokusu v ČR vyplýva veľmi dobrá odolnosť proti mučnatke trávovej a ďalším listovým chorobám
- Odroda preferovaná a vykupovaná SLADOVNAMI SOUFFLET ČR, a. s.

AGRONOMICKÉ ODPORÚČANIA:

- Odporúčaný výsevok: skorý termín 3,5–3,7 MKS, optimálny termín 3,7–3,9 MKS, neskorý termín 4,0–4,3 MKS.
- Najefektívnejším riešením v boji proti múčnatke trávovej a chorobám päty stebľa je v intenzívnej technológii pestovania použiť morenie SYSTIVOU.
- Herbicídne ošetrovanie odporúčame robiť už na jeseň s možnosťou regulácie trávovitých burín, nezabúdať použiť insekticíd Sherpa 100 EW 0,25 l/ha a zmáčadlo MultiAD 0,1 l/ha v boji proti prenášačom viróz.
- Vo fáze 1. až 3. kolienka aplikujte trinexapac-ethyl v dávke 50–75 g/ha, na vlajkový list ethephon 150 až 300 g/ha.
- Na vlajkový list použite kombináciu azoxystrobinu 125 g/ha + ProthioGUARD Plus SK 0,4 l/MetcoGUARD 0,75 l/ha + Multi AD 0,1 l/ha.
- Výskyt fuzarióz eliminujte aplikáciou TebuGUARD Plus 0,5 l/ha alebo MetcoGUARD 1 l/ha + MultiAD 0,1 l/ha.
- Celkovú dávku dusíka 60–110 kg rozdeľte na regeneračnú 2/3 v dobe obnovy rastu po zime a produkčnú 1/3 najneskôr vo fáze prvého kolienka.


Zdravotný stav



VÝSLEDKY PILOTNÝCH SKÚŠOK OZIMNÝCH SLADOVNÍCKYCH JAČMEŇOV

Odroda	výnos (t/ha)	obsah N-látok (%)	prepad %
Comtesse (2r)	8,08	8,5	95,4
Odroda1 (6r)	5,54	9,3	93
Odroda 2 (2r)	6,64	10,6	95
KWS Faro (6r)	6,86	9,9	86

PREDSKÚŠKY OZIMNÝCH JAČMEŇOV 2023/2024, VÝNOS ZRNA 14 % V T/HA (OŠETRENÉ)



Veľmi skorá odroda Comtesse presvedčila svojím zdravotným stavom a čistým výnosom 6,7 t/ha i na množiteľskej ploche v roku 2024 - Otaslavice (okr. Prostějov), fotografované 7. 5. 2025. Zásadným faktorom výnosu predného zrna bola dobre zvládnutá, rozdelená dvojitá morforegulácia na jar (ú.l. trinexapac-ethyl a následne ú.l. ethephon) s dôrazom na fungicídne ošetrovanie vlajkového listu kombináciou ú.l. azoxystrobin + prothioconazole.